

Votre chien souffre-t-il également de MII/IGR ?

Gratuit
Test en ligne
SOUS
www

.ibd-hund.de

Si vous remarquez plus de quatre symptômes chez votre chien, nous vous recommandons d'utiliser le test en ligne gratuit :

- Faim intense • Perte de poids • Anxiété • Besoin douloureux d'aller à la selle • Isolement • Bruits intestinaux particulièrement forts • Réaction de sursaut • Diarrhée récurrente • Coprophagie (ingestion d'herbe) • Agitation accrue, y compris la nuit • Selles ou diarrhée sanglantes • Besoin nocturne d'aller à la selle • Selles glaireuses ou enrobées de mucus • Volume des selles généralement faible • Parfois, défécation explosive sans volume important • Agressivité • Incontinence nocturne • Se mordre les jambes de façon compulsive
- Brûlures d'estomac • Léchage de tapis • Crises épileptiformes • Syndrome de PICA • Crises récurrentes dont la fréquence augmente lentement au fil du temps (années)



Yes, we canIBD!

De l'aide est disponible ici :

Pour en savoir plus, consultez le site www.ibd-hund.de et www.lupovet.de.

Éléments clés du traitement des MII canin

alimentation à partir de

Ligne IBDerma

IBDerma Hyposens

(en format miniature à l'IGOR)

IBDerma HappyChi

IBDerma VeggieSens

IBDerma Tapiovo Mini

(avec de l'eau)

Supplément

LupoVet

IGOReflux IGORezym

& IGORvegan

Inu-tryptophane

Lup-Entérol

PropionArte

Boswellia serrata 65% BA

S'FERCKEL

aime les SMS

S comme choucroute

M comme soupe Moro

F comme thé au fenouil

A comme artichaut

E comme vinaigre

G comme l'agoutte

R comme betterave

S comme cornichons

C comme chicorée

M comme acide lactique

K comme fromage

E comme endives

S comme travers de porc

L comme foie

Médical

après vétérinaire

voter

Psyché/ Sociale

Paix et

Équilibre

Environnement stable

confiance et

espace ouvert

Récompense/ acceptation

En-cas appropriés
de LupoVet

IBDerma Tapiovo Mini

Conserves de viande pure/

Sacs de fraîcheur LupoVet

